

<医師用>

クラルテ保育園

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。

(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。)

### 意見書

クラルテ保育園施設長殿

入所児童名

病名「

」

症状も回復し 年 月 日から集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関

医師名

印又はサイン

保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人ひとりの子どもが一日快適に生活できるよう、下記感染症について意見書の提出をお願いします。

感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能な状態となってからの登園であるようご配慮ください。

#### ○医師が記入した意見書が望ましい感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻しん(はしか)	発症 1日前から出現後の 4日後まで	解熱後 3日を経過してから
インフルエンザ	症状がある期間(発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症した後 5日を経過し、かつ解熱した後 3日を経過するまで
新型 コロナウイルス	発症前 2日～後 5日くらい	発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1日を経過すること
風しん	発しん出現の前 7日～後 7日間くらい	発しんが消失してから
水痘(水ぼうそう)	発しん出現 1～2日前から痂皮形成まで	すべての発しんが痂皮してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症 3日前から耳下腺腫脹後 4日	耳下腺、頸下腺、舌下腺の腺脹が出現してから 5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認めるまで
咽頭結膜炎	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え 2日経過してから
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は 5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
腸管出血性大腸菌 感染症 (O157、 O26、O111 等)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48 時間をあけて連続 2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から 1～2 週間、便から数週間～数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで